


УКРАЇНА

UKRAINE



ПАТЕНТ

НА КОРИСНУ МОДЕЛЬ

№ 40528


**СПОСІБ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО МОДЕЛЮВАННЯ
ЕРОЗИВНО-ВИРАЗКОВИХ УРАЖЕНЬ СЛИЗОВОЇ ШЛУНКА
ТА ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ У ЩУРІВ ЗА ДОПОМОГОЮ
ГІДРОКСИДУ АМОНІЮ**

Видано відповідно до Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі".

Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 10.04.2009.

Голова Державного департаменту
інтелектуальної власності

М.В. Паладій



(11) 40528

(19) UA

(51) МПК (2009)

A61K 49/00

A61K 33/02

(21) Номер заявки: u 2008 13808

(22) Дата подання заявки: 01.12.2008

(24) Дата, з якої є чинними права на корисну модель: 10.04.2009

(46) Дата публікації відомостей про видачу патенту та номер бюлетеня: 10.04.2009, Бюл. № 7

(72) Винахідники:

Авраменко Анатолій
Олександрович (UA),
Гоженко Анатолій Іванович
(UA),
Смоляков Сергій
Миколаєвич (UA)

(73) Власники:

Авраменко Анатолій
Олександрович,
вул. Чкалова, 118, кв. 4,
м.Миколаїв, 54003, Гоженко
Анатолій Іванович,
вул.Канатна,92, м.Одеса,
65039, Смоляков Сергій
Миколаєвич,
пер.Первомайський,63,кв.78,
м.Миколаїв, 54000

(54) Назва корисної моделі:

СПОСІБ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ЕРОЗИВНО-ВИРАЗКОВИХ УРАЖЕНЬ СЛИЗОВОЇ ШЛУНКА ТА ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ У ЩУРІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ГІДРОКСИДУ АМОНІЮ

(57) Формула корисної моделі:

Спосіб експериментального моделювання ерозивно-виразкових уражень слизової шлунка та дванадцятипалої кишки у піддослідних тварин, а саме у щурів, який здійснюється за допомогою продукту життєдіяльності HP-інфекції - гідроксиду амонію, який відрізняється тим, що ерозивно-виразкові ураження слизової шлунка та дванадцятипалої кишки у піддослідних тварин моделюються за допомогою готового розчину гідроксиду амонію: під поверхневим ефірним наркозом у шлункову порожнину щурів, які 1 добу перебували без їжі, за допомогою зонда вводять 1-2 мл 1-2 % розчину гідроксиду амонію, після чого тварин поміщають у помешкання без доступу до їжі та води на 1 добу.



УКРАЇНА

(19) UA (11) 40528 (13) U

(51) МПК (2009)
A61K 49/00
A61K 33/02

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ
І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ
ВЛАСНОСТІ

ОПИС
ДО ПАТЕНТУ
НА КОРИСНУ МОДЕЛЬ

видається під
відповідальність
власника
патенту

(54) СПОСІБ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ЕРОЗИВНО-ВИРАЗКОВИХ УРАЖЕНЬ СЛИЗОВОЇ ШЛУНКА ТА ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ У ЩУРІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ГІДРОКСИДУ АМОНІЮ

1

2

(21) u200813808

(22) 01.12.2008

(24) 10.04.2009

(46) 10.04.2009, Бюл.№ 7, 2009 р.

(72) АВРАМЕНКО АНАТОЛІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ, УА, ГОЖЕНКО АНАТОЛІЙ ІВАНОВИЧ, УА, СМОЛЯКОВ СЕРГІЙ МИКОЛАЄВИЧ, УА

(73) АВРАМЕНКО АНАТОЛІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ, УА, ГОЖЕНКО АНАТОЛІЙ ІВАНОВИЧ, УА, СМОЛЯКОВ СЕРГІЙ МИКОЛАЄВИЧ, УА

(57) Спосіб експериментального моделювання ерозивно-виразкових уражень слизової шлунка та

дванадцятапалої кишки у піддослідних тварин, а саме у щурів, який здійснюється за допомогою продукту життєдіяльності НР-інфекції - гідроксиду амонію, який відрізняється тим, що еrozивно-виразкові ураження слизової шлунка та дванадцятапалої кишки у піддослідних тварин моделюються за допомогою готового розчину гідроксиду амонію: під поверхневим ефірним наркозом у шлункову порожнину щурів, які 1 добу перебували без їжі, за допомогою зонда вводять 1-2мл 1-2% розчину гідроксиду амонію, після чого тварин поміщають у помешкання без доступу до їжі та води на 1 добу.

Корисна модель відноситься до медицини, а саме до експериментальної патофізіології захворювань шлунково-кишкового тракту (ШКТ), і може бути використана для моделювання еrozивно-виразкових уражень слизової шлунка та дванадцятапалої кишки у піддослідних тварин, а саме - у щурів.

За останніми даними етіологічним чинником хронічного гастриту (ХГ) типу В у людини є специфічна бактеріальна флора - *Helicobacter pylori* (НР). При певних обставинах ХГ типу В може трансформуватися у ВХ [Гоженко А.І., Авраменко А.О. До питання про взаємовідношення НР-інфекції та кислотно-пептичного чинника при різних стадіях і періодах виразкової хвороби дванадцятапалої кишки // Буковинський медичний вісник. - 2003. - №2. - С.43-48]. Процес утворення еrozивно-виразкових уражень слизової шлунка та дванадцятапалої кишки має пряму залежність від концентрації у шлунковій порожнині залишкового аміаку (ЗА) - аміаку, який продукує НР і який не пішов на нейтралізацію хлористоводневої кислоти шлунка [Авраменко А.А., Петрашенко Н.П., Жуков В.А. К вопросу о концентрации «остаточного» аммиака в полости желудка у больных язвенной болезнью 12-ти перстной кишки в разные фазы патологического процесса // журнал "Актуальні проблеми транспортної медицини". - 2006. - №3 (5). - С.86-89.], При певних обставинах ЗА, поєд-

навшись з водою, утворює гідроксид амонію, який є юкою лугою і може завдати уражень слизовій шлунка та дванадцятапалої кишки. Однак у природних умовах НР-інфекція не колонізує слизову шлунка щурів [Чопей І.В., Колесник П.О., Кузьмик В.М. и др. Сучасні погляди на епідеміологію інфекції *Helicobacter pylori* // Сучасні інфекції. - 2000. - №4. - С.65-69], що потребує створення експериментальної моделі еrozивно-виразкових уражень слизової шлунка та дванадцятапалої кишки, де чинником ушкодження є гідроксид амонію.

Відомий спосіб механічного моделювання виразкової хвороби -моделювання за Шеєм. Модель виразкоутворення за Шеєм має на увазі перев'язування пілоричного відділу шлунка у щурів, яким за 7 діб до цього вилучили підщелепні та під'язичні залози. Через 1 добу після накладення лігатури на пілоричний замікач щурів декапітують під поверхневим ефірним наркозом і вивмають шлунки для вивчення їх стану. При цій моделі еrozивно-виразкові ураження слизової шлунка різного ступеню виразності (від ерозій до тяжких проривних виразок) знаходять у всіх щурів у 100% випадків (у середньому, у кожного щура спостерігаються 1-2 проривні виразки) [Левицький А.П., Макаренко О.А., Зубков О.Б., Гайдик В.С. Профілактика ускладнень виразкової хвороби шлунка адаптогенным препаратом «Бютріт» // Одеський медичний журнал. - 2001. - №6. - С.20 – 23].

(19) UA (11) 40528 (13) U

Однак даний спосіб має свої вади: даний спосіб тільки імітує процес виразкоутворення, тому що у людей виразки утворюються при збережених підщелепних та під'язичних залозах і без порушення проходження пілоричного каналу; даний спосіб викликає ушкодження тільки слизової шлунка, в той час як слизова 12-палої кишки залишається непошкодженою; при даному способі у шлунковій порожнині щурів відсутня висока концентрація аміаку, тому що виробник аміаку - НР-інфекція - у щурів у природних умовах на слизовій шлунку відсутній.

Відомий спосіб термічного моделювання виразкової хвороби - відтворення виразкового дефекту шляхом глибокого, до температури рідкого азоту (-196°C), охолодження обмеженої ділянки стінки шлунка. Під місцевою анестезією 0,5% розчином новокайну роблять верхнє-серединну лапаротомію, після чого шлунок виводять у рану. Спеціальний пристрій (діаметр - 10мм, товщина - 2мм), заздалегідь витриманий протягом 2-3 хвилин у рідкому азоті, щільно притискають до серозної оболонки шлунка у обраному місці протягом 10-15 секунд, внаслідок чого віdbувается швидке і глибоке замороження стінки шлунка. Після аплікації пристрій легко відокремлюється від серозної оболонки внаслідок його природного нагрівання оточуючим повітрям і тепловим випромінюванням тварини [Вертелкин В.А., Голофеевский В.Ю., Стефанюк Н.Ф. Криогенный способ формирования экспериментальной язвы желудка // Патологическая физиология и экспериментальная терапия. - 1987. - №2. - С.77-78].

Однак даний спосіб має свої вади: даний спосіб тільки імітує процес виразкоутворення, тому що у людей виразки утворюються при температурі +37°C; рідкий азот не утворюється у шлунковій порожнині людини у природних умовах; при даному способі у шлунковій порожнині щурів відсутня висока концентрація аміаку, тому що виробник аміаку - НР-інфекція - у щурів у природних умовах на слизовій шлунку відсутній.

Відомий спосіб хімічного моделювання виразкової хвороби - резерпін-бутадіонова модель. Піддослідним щуром внутрішньоочеревинно вводять бутадіон (100мг/кг) і резерпін (2мг/кг) протягом 3 діб, при цьому на слизовій шлунка утворюється виразково - деструктивне ураження у вигляді безлічі краплинних утворень розміром від 0,5x1,0 до 2x3мм. [Никулин А.А., Буданцева С.И. Сравнительная оценка методов воспроизведения экспериментальных язв желудка // Фармакология и токсикология. - 1973. - №5. - С.564-567.]

Однак даний спосіб має свої вади: даний спосіб тільки імітує процес виразкоутворення, тому що у людей виразки утворюються і без потрапляння до організму резерпіну та бутадіону; даний спосіб викликає ушкодження тільки слизової шлунка, в той час як слизова 12-палої кишки залишається непошкодженою; при даному способі у шлунковій порожнині щурів відсутня висока концентрація аміаку, тому що виробник аміаку - НР-інфекція - у щурів у природних умовах на слизовій шлунку відсутній.

Відомий спосіб хімічного моделювання виразкової хвороби - оцтова модель за Окабе. Піддослідним щуром на серозну оболонку органу через кільце з потрібним внутрішнім діаметром наносять льодяну оцтову кислоту протягом 30с [Зиматкин С.М., Углинича К.Н. Влияние ретаболила на заживление ацетатной язвы 12-ти перстной кишки и пострезекционной раны желудка у крыс // Язвенная болезнь. Клинические и экспериментальные исследования: сборник научных трудов. - Гродно, 1983. - С.33-39].

Однак даний спосіб має свої вади: даний спосіб тільки імітує процес виразкоутворення, тому що льодяна оцтова кислота не утворюється у шлунковій порожнині людини у природних умовах; при даному способі у шлунковій порожнині щурів відсутня висока концентрація аміаку, тому що виробник аміаку - НР-інфекція - у щурів у природних умовах на слизовій шлунку відсутній.

Відомий спосіб моделювання виразкової хвороби за механізмом стресових уражень - модель іммобілізаційного емоційного стресу. Щурів поміщають у спеціальний пристрій у вертикальному положенні до низу головою на 24 години, після чого щурів декапітують під поверхневим ефірним наркозом і вимірюють шлунки для вивчення їх стану. При цій моделі ерозивно-виразкові ураження слизової шлунка різного ступеню виразності (від ерозій до тяжких проривних виразок) знаходять у всіх щурів у 100% випадків (у середньому, у кожного щура спостерігаються 1-2 проривні виразки) [Левицький А.П., Зубков О.Б., Макаренко О.А., Гайдик В.С., Семанів О.М. Оцінювання проти виразкової дії бальзаму «Біотрікс» на стресовій моделі виразок шлунка у щурів // Одеський медичний журнал. - 1999. - №2. - С.10-11].

Однак даний спосіб має свої вади: даний спосіб тільки імітує процес виразкоутворення, тому що у людей у природних умовах виразки утворюються у вертикальному положенні догори головою; даний спосіб викликає ушкодження тільки слизової шлунка, в той час як слизова 12-палої кишки залишається непошкодженою; при даному способі у шлунковій порожнині щурів відсутня висока концентрація аміаку, тому що виробник аміаку - НР-інфекція - у щурів у природних умовах на слизовій шлунку відсутній.

Найбільш близьким до заявленого технічного рішення є спосіб біохімічного моделювання виразкової хвороби. За допомогою зонду під уретановим наркозом тваринам внутрішньошлунково вводять сечовину за концентрацією 0,25-2,5мг/мл та 100 - 1000ОД фермента уреази, що призводить до швидкого збільшення концентрації аміаку у шлунковій порожнині, і, відповідно, з нашої точки зору, до утворення гідроксиду амонію. При цьому одночасно відмічається негативний вплив уреази на моторну функцію шлунка і шлунковий кровообіг. При обстеженні слизової шлунка після декапітації тварин відмічаються виразкові ураження різного розміру [Рожавин М.А. Патогенные свойства *Campylobacter pylori* // Клиническая медицина. - 1989. - №11. - С.20-23].

Однак даний спосіб має свої вади: даний спосіб викликає ушкодження тільки слизової шлунка, в

той час як слизова 12-палої кишки залишається непошкодженою; препарат, який містить фермент уреазу, має велику ціну.

В основу запропонованої корисної моделі поставлено задачу створення способу експериментального моделювання ерозивно-виразкових уражень слизової шлунка та дванадцяталої кишки у піддослідних тварин, а саме - у щурів, що гарантує зручність проведення моделювання ерозивно-виразкових уражень, максимальну подібність уражень у тварин до уражень у людей, а також не потребує великих витрат.

Поставлена задача вирішується тим, що, згідно корисної моделі, експериментальне моделювання еrozивно-виразкових уражень слизової шлунка та дванадцяталої кишки у піддослідних тварин, а саме - у щурів, здійснюється за допомогою введення у шлункову порожнину щурів за допомогою зонду 1-2мл 1-2% розчину гідроксиду амонію.

Способ здійснюється наступним чином

Під поверхневим ефірним наркозом у шлункову порожнину щурів, які 1 добу перебували без їжі, за допомогою зонду вводять 1 - 2мл 1-2% розчину гідроксиду амонію, після чого тварин поміщають у помешкання без доступу до їжі та води на 1 добу.

Приклад конкретного застосування.

Під час проведення експериментального моделювання еrozивно-виразкових уражень слизової шлунка та дванадцяталої кишки (проток №7) щуру - самцю віком 2,5 місяця під поверхневим

ефірним наркозом у шлункову порожнину було введено 2мл 2% розчину гідроксиду амонію. Піддослідна тварина залишилась живою і через 1 добу під поверхневим ефірним наркозом була декапітована, після чого було вилучено шлунок та дванадцяталої кишка для вивчення стану їх слизової.

Після розтину шлунка по великій кривині в антравальному відділі шлунка було візуально зафіксовано 3 ушкодження слизової ($d=0,4-0,7\text{cm}$), які були покриті фібрином і некрозом сіро-жовтого кольору. При розтині дванадцяталої кишки на слизовій було візуально зафіксовано 5 поверхневих ушкоджень слизової ($d=0,1-0,4\text{cm}$).

Дані гістологічного дослідження уражень слизової шлунка щура відповідали картині гострої виразки: некроз слизової оболонки, некроз власної пластинки слизової оболонки, некроз підслизової оболонки; інфільтрація поліморфними лейкоцитами глибших тканин; набряк глибших тканин.

Дані гістологічного дослідження уражень слизової дванадцяталої кишки щура відповідали картині гострої ерозії: некроз слизової оболонки до власної пластинки, крововиливи у вигляді геморагій, порушення мікроциркуляції.

Таким чином, у порівнянні з прототипом, заявлений спосіб є більш зручним, дозволяє швидко і максимально достовірно провести експериментальне моделювання еrozивно-виразкових уражень слизової шлунка та дванадцяталої кишки, а також не потребує великих витрат.